

Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky

Príklady z cvičenia

cvíko bolo 27.2.2019

testovanie hypotéz, Bayesovská štatistika

Akékoľvek otázky smelo smerujte na juraj(a)tekel(b)gmail(c).com

Príklad 1 (Chrípková imunita). Chceme skúmať, aká časť ľudí ma voči chrípke prirodzenú imunitu. Navrhnite test, ktorým by ste to skúmali a za akých podmienok by ste prehlásili, že prirodzená imunita voči chrípke je na úrovni 50%.

Príklad 2 (■ Očkovanie proti chrípke 1). Testy ukázali, že 50% ľudí ma proti chrípke prirodzenú imunitu. Pri teste vakcín proti chrípke sme tesťovali 200 ľudí, polovicu z nich sme zaočkovali a polovicu nie. Zo zaočkovaných na chrípku nakońiec ochorelo iba 35 ľudí. V kontrolnej skupine ste trafili presne, a ochorelo presne 50 ľudí. Je vakcína účinná?

Príklad 3 (■ Očkovanie proti chrípke 2). V akom intervale môžete predpokladať účinnosť vakcín z predchádzajúcej úlohy na základe tohto testu, ak uvažujeme $p = 0.05$?

Príklad 4 (Očkovanie proti chrípke 3). Urobme rovnaký test na účinnosť vakcín ako v úlohe 3. V kontrolnej skupine však uvažujte najväčšie možné fluktuácie. V akom intervale môžete predpokladať účinnosť vakcín tentoraz. Koľko ľudí by sme mali testovať, aby sme mohli vakcínu prehlásiť za účinnú aj za predpokladu veľmi vysokej fluktuácie?

Príklad 5 (■ Frekvencionistická minca). Máme mincu, o ktorej si nie sme istý, že je férová. Urobíme teda experiment, mincu n krát hodíme a dostaneme n_1 krát znak.

- Za akých podmienok o minci vyhlásime, že férová nie je?
- Po koľkých hodoch odhalíme úplne neférovú mincu s $p = 1$?

Príklad 6 (■ Bayesovská minca). Máme mincu, o ktorej si nie sme istý, že je férová a na overenie tohto faktu urobíme rovnaký experiment ako v

predchádzajúcej úlohe. Avšak vyhodnocujeme ho Bayesovsky. To znamená, že na začiatok uvažujeme, že o minci nemáme žiadnu informáciu.

- Čo môžme na základe experimentu o minci usúdiť?
- Aká bude očakávaná neférovosť mince $\langle p \rangle$? (pre férovú mincu $p = 1/2$)
- Ako bude vyzerat študovanie úplne neférovej mince?

Príklad 7 (FC Beňušovce). Futbalový tím [FC Beňušovce] včera hral víťazný zápas. Ak vieme, že futbalisti tohto tímu hrajú 60% zápasov večer a nočných zápasov vyhrajú 55%, ale denných iba 35%, s akou pravdepodobnosťou bol včerajší zápas večer?

Príklad 8 (Extrémne neinovatívna úloha na precvičenie). Majme dve vreca s bielymi a čiernymi guličkami, označené X a Y. Vrece X obsahuje $p_X = 20\%$ bielych guličiek a vrece Y obsahuje $p_Y = 40\%$ bielych guličiek. Z náhodného vreca vytiahneme 9 guličiek, z toho 3 biele. S akou pravdepodobnosťou to bolo vrece X?

Príklad 9 (■ Spresnenie merania). Meranie istej veličiny ukázalo hodnotu 10 so štandardnou odchýlkou 7 (Gaussovské rozloženie). Chceme túto hodnotu spresniť a preto zoberieme merací prístroj, na ktorom sa dočítame, že pre $\sigma = 4$ a urobíme dve nové merania. Dostaneme výsledky 4 a 6. Čo vieme o hodnote tejto veličiny povedať teraz?

Príklad 10 (Ups). Meranie hmotnosti častice ukázalo, že jej hmotnosť by mala byť $(-0.3 \pm 1)eV$. To ale tak nemôže byť, nakoľko hmotnosť je určite kladná. Aká je očakávaná hmotnosť častice po uvážení tohto faktu?