

Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky

Domáca úloha 1

zadaná 17.3.2022, riešenia mi pošlite na email najneskôr do 7.4.2022

Príklad 1 (Opakovanie štatistickej fyziky). Majme systém N spinov s možnými stavmi $\{0, 1\}$ a energiami $\{-\varepsilon, \varepsilon\}$. Definujme magnetizáciu ako $M = n_1 - n_0$.

- a. Nájdite entropiu a teplotu tohto systému, keď sa na neho pozeráme ako na **mikrokanonický súbor** s energiou E .
 - b. Za akých podmienok, ak vôbec, môže byť táto teplota záporná?
 - c. Nájdite magnetizáciu systému M ako funkciu E .
 - d. Ďalej sa na spiny budeme pozerať ako na **kanonický súbor** s teplotou T . Nájdite strednú energiu systému \bar{E} a ukážte že výsledok je kompatibilný s mikrokanonickým výsledkom.
 - e. Vypočítajte strednú magnetizáciu.
 - f. Vypočítajte entropiu $S = k \log (\Omega(\bar{E}))$.
 - g. Vypočítajte entropiu z kanonickej partičnej sumy Z .
-

Príklad 2 (Generátor náhodného smeru). Dotiahnite úlohu o generovaní náhodného smeru v troch rozmeroch do konca. To znamená, že máme generátor dvoch rovnomerne rozdelených náhodných čísel ξ, η na intervale $(0, 1)$ a chcete z nich vyrobiť uhly θ, ϕ , ktoré budú reprezentovať rovnomerne rozdelený náhodný smer v troch rozmeroch.

Príklad 3 (Ups). Meranie hmotnosti častice ukázalo, že jej hmotnosť by mala byť $(-0.3 \pm 1)eV$. To ale tak nemôže byť, nakoľko hmotnosť je určite kladná. Aká je očakávaná hmotnosť častice po uvážení tohto faktu?

Príklad 4 (Metropolisov algoritmus ako generátor náhodných čísel). **Bonus.**

Majme náhodnú premennú x , ktorá je rozdelená podľa rozdelenia pravdepodobnosti $p(x)$. Zostrojme nasledujúcu postupnosť hodnôt náhodnej premennej $\{x_i\}, i = 1, \dots, N$. Začnime s nejakou hodnotou x_0 , na základe algoritmu ktorý bude špecifikovaný neskôr zvoľme testovaciu hodnotu x_t a urobme pomer

$$\alpha = \frac{p(x_t)}{p(x_0)}.$$

Potom vyberieme náhodné číslo q z intervalu $(0, 1)$ a ak $\alpha \geq q$, za x_1 zvolíme x_t , ak $\alpha < q$ za x_1 zvolíme x_0 . Rovnakú postup opakujeme postupne pre ďalšie x_i . Dá sa ukázať, že rozdelenie takomto súbore hodnôt $\{x_i\}$ konverguje k $p(x)$, t.j. že vybrať náhodne z tohto súboru je to isté ako vybrať náhodne zo všetkých možných x podľa rozdelenia pravdepodobnosti $p(x)$.

- a. Za náhodnú premenную zvoľme celé čísla \mathbb{Z} a $x_0 = 0$. Za algoritmus generovania x_t zoberme náhodný krok veľkosti 1 vpravo alebo vľavo. Takýto algoritmus vygeneruje pre $p(x) = e^{-x^2/2}$ postupnosť celých čísel rozdelených podľa Gaussova rozdelenia. Overte to počítačovým programom. Skúste, ako váš výsledok závisí od voľby N a ako to vyzerá, keď budete čísla x voliť na číselnej osi hustejšie.
- b. Vyskúšajte rôzne iné rozdelenia $p(x)$, napríklad aj také, kedy neviete nájsť generátor metódou inverzná k primitívnej. Kedy funguje Metropolis lepšie, ako táto metóda?